

15) Pero D'Agosto

PESO / DIMENS.
FRUTTO: 270 gr.

Landrace. Pera ritrovata a Brescia, Amelia (TN) Umbria (Italian in situ landrace inventory (http://vnr.unipg.it/PGRSecure/html/national_inventory.html))
circonferenza 25 cr Ø 8 cm 7.961783

N. GIBA	Codici: UPOV incep	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DESCRIZIONE	
1 GIBA	1 6.1.2	Vigore dell'albero			X
		debole	Precoce di Trévoux	3	
		medio forte	William's Beurré d'Amanlis	5 7	
2	2 (*)	Tipo di ramificazione			X
		assente o molto debole	Jeanne d'Arc	1	
		debole	Buona Luisa d'Avranches	3	
		medio	Conference	5	
		forte molto forte	Alexandrine Douillard Oliver de Serres	7 9	
3 GIBA	3 (*) 6.1.1	Portamento dell'albero			X
		fastigiato	Jeanne d'Arc	1	
		eretto	Beurré Clairgeau	2	
		semi-eretto	Colorée de Juillet	3	
		espanso	Madame Ballet	4	
		pendulo/ricadente piangente	Beurré Diel Armida, Beurré d'Amanlis	5 6	
4	5	Rami di 1 anno: lunghezza dell'internodo			X
		corto	Conference	3	
		medio	Jeanne d'Arc	5	
		lungo	Santa Maria	7	
5	6	Rami di 1 anno: colore predominante del lato esposto al sole			
		grigio-verde	Mirandino rosso	1	
		grigio-marrone	Concorde	2	
		marrone	Precoce di Trévoux	3	
		marrone aranciato	Eva Baltet	4	
		rosso mattono	Beurré Hardy	5	
		marrone purpureo	Nordhäuser	6	
marrone scuro	Winterforelle Jeanne d'Arc	6 7			
6	7	Rami di 1 anno: numero di lenticelle			X
		poche	Trionfo di Vienna	3	
		medie	William's	5	
		molte	Beurré d'Amanlis	7	
7	11 (*)	Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice vegetativo			X
		assente o molto debole	Clapp's Favourite	1	
		debole	Decana del Comizio	3	
		media	Beurré Hardy	5	
		forte molto forte	Red Bartlett Liegels Winterbutterbirne	7 9	
8	64 (*) 6.2.1.	Epoca di inizio fioritura			X
		molto precoce	Beurré Alexandre	1	
		precoce	Lucas Delfrap	3	
		intermedia	Packham's	5	
		tardiva molto tardiva	Jeanne d'Arc Frangipane	7 9	
9	27 (*)	Gemme fiorali: lunghezza			X
		corte	Beurré Alexandre Lucas	3	



49
50
55
66
49-66 cm, media 55
55

21-30 media 24



		medie	Buona Luisa	5	
		lunghe	d'Avranches Beurré Hardy	7	
10	30 (*)	Fiore: posizione dei margini dei petali			X
		separati	Kaiser	1	
		che si toccano	Jeanne d'Arc	2	
		sovrapposti	Conference	3	
11	33 (*)	Fiore: forma dei petali			X
		circolare	Comtesse de Paris	1	
		ampiamente ovata	Beurré Hardy	2	
		ovata	Kaiser	3	
12	31	Fiore: posizione dello stigma in relazione agli stami			X
		sotto	Jeanne d'Arc	1	
		stesso livello	Beurré Hardy	2	
		sopra	Beurré d'Amanlis	3	
13	13 (*)	Lamina fogliare: posizione in relazione al ramo			X
		verso l'alto	Precoce di Trévoux	1	
		orizzontale	Decana del	2	
		verso il basso	Beurré Giffard	3	
14	16 (*)	Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza			X
		molto piccolo	Curé	1	
		piccolo	Président Drouard	3	
		medio	Conference	5	
		grande	Triomphe de	7	
		molto grande	Beurré Lebrun	9	
15	17	Lamina fogliare: forma della base			X
		acuta	Beurré Giffard	1	
		angolo retto	Santa Maria, Grand Champion	2	
		ottusa	Général Leclerc	3	
		troncata	Beurré Hardy	4	
		cordata	Président Drouard	5	
16	18	Lamina fogliare: forma all'apice			X
		acuta	Conference	1	
		angolo retto	William's	2	
		ottusa	Beurré Clairgeau	3	
		rotonda	Curato	4	
17	20	Dentatura del margine fogliare			X
		assente	Beurré Giffard	1	
		crenato	Beurré d'Amanlis	2	
		decisamente serrato	Alexandrine	3	
		nettamente seghettato	Douillard General Leclerc	4	
18	22 (*)	Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale			X
		debole	Precoce di Trévoux	3	
		media	Beurré Giffard	5	
		forte	Comtesse de Paris	7	
19	23 (*)	Picciolo: lunghezza			X
		corto	Épine du Mas	3	
		medio	Beurré Hardy	5	
		lungo	Trionfo di Vienna	7	
20	25 (*)	Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo			X
		corta	Comizio	3	
		media	Beurré Bosc	5	
		lunga	Conference	7	
21	65 (*)	Epoca di maturazione per la raccolta			X
		molto precoce	Mirandino rosso	1	
		precoce	Precoce di Trévoux	3	
		intermedia	Coscia	5	
		tardiva	Jeanne d'Arc	7	
		molto tardiva	Beurré Hardy Président Drouard	9	
		Forma del frutto			

	Lunghezza	Larghezza	Rapporto Lunghezza/Larghezza
	6.3	5.4	1.17
	4.5	4.2	1.07
medio 1.22	6.8	5.3	1.28
	7.6	5.9	1.29
	5.5	4.6	1.20
	6.6	5.3	1.25
	5.6	5.3	1.06
	6.4	4.7	1.36
	5.7	4.5	1.27
	5.8	4.5	1.29
	6.08	4.97	1.22



3.1-3.8 cm

Frutti non maturi 17 giugno



22	6.2.10	sferoidale	Fico di Udine	1	X
		turbinata breve	Spina Carpi	2	
		maliforme	Oliver de Serres, Passa Crossara	3	
		doliforme	Decana di Inverno	4	
		turbinata	Uta	5	
		piriforme	Coscia	6	
		cidoniforme	William	7	
		calebassiforme	Abate Fétèl	8	



23	41 (*) 6.2.8	Dimensione del frutto			X
		molto piccolo	Garofalo	1	
		piccolo	Doyenné de Juillet	3	
		medio	Dr. Guyot	5	
		grande	Decana del Comizio, Passa	7	
		molto grande	Margarete	9	

Nel 2024 non ha prodotto frutti. I dati sono desunti da repertorio fotografico.

24	44 (*) 6.2.12	Colore di fondo della buccia			X
		non visibile	Grand Champion, Uta	1	
		verde	Noveau Poiteau	2	
		verde giallastro	Beurré Giffard, Beurré Hardy	3	
		giallo	Président Drouard	4	

Nel 2024 non ha prodotto frutti. I dati sono desunti da repertorio fotografico.

25	45 (*) 2.6.13	Frutto: estensione area di sovraccolore			X
		assente o molto piccola	Passa Crassana	1	
		piccola	Precoce di Trévoux	3	
		media	Nordhäuser Winterforelle	5	
		estesa	Beurré Clairgeau	7	
		molto estesa o intera superficie	Starkrimson	9	

Nel 2024 non ha prodotto frutti. I dati sono desunti da repertorio fotografico.

26	46	Tonalità di sovraccolore			X
		arancione	Precoce di Trévoux	1	
		rosso arancione	Duchesse Elsa	2	
		rosso rosato	Belle Angevine	3	
		rosso chiaro	Nordhäuser Winterforelle	4	
		rosso scuro	Starkrimson	5	

Nel 2024 non ha prodotto frutti. I dati sono desunti da repertorio fotografico.

27	50 (*) 2.6.11	Frutto: lunghezza del peduncolo			X
		corto	Beurré d'Anjou	3	
		medio	Beurré Hardy	5	
		lungo	Kaiser, Curato	7	

Nel 2024 non ha prodotto frutti. I dati sono desunti da repertorio fotografico.

28	51 (*)	Frutto: spessore del peduncolo		
		sottile medio	Concorde Beurré	3
		spesso	Hardy Beurré d'Anjou	5 7

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

29	53 (*)	Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse		
		dritto	Bonne de Beugny	1
		obliquo	Decana del Abate Fétèl	2 3

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

30	54 (*)	Frutto: profondità della cavità del peduncolo		
		assente o molto piccola	Conference	1
		piccola	Buona Luisa d'Avanches	3
		media	Precoce di Trévoux	5
		profonda	Passa Crassana	7
		molto profonda	Oliver de Serres	9

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

31	57 (*)	Frutto: profondità della cavità calicina (alla raccolta)		
		assente	Eparene	1
		poco profonda	Precoce di Trévoux	3
		media	Beurré Giffard, Beurré Hardy	5
		profonda	Passa Crassana	7

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

32	58 (*)	Frutto: ampiezza della cavità calicina (alla raccolta)		
		stretto	Williams'	3
		medio	Beurré Hardy	5

		ampio	Passa Crassana	7
33	60	Frutto: tessitura della polpa		
		fine	Beurré Hardy	3
		media	Kaiser	5
		grossolana	Curato	7
34	61 6.2.21	Frutto: consistenza della polpa		
		tenera	Jeanne d'Arc	3
		media	Beurré Hardy	5
		soda	Comtesse de Paris	7
35	62	Frutto: succosità della polpa		
		asciutta media	Mirandino rosso	3
		succosa	Williams'	5
			Conference	7
		molto succosa	Decana del	9
36	63 (*)	Seme: forma		
		rotondo	Jeanne d'Arc	1
		ovato ellittico	Beurré Giffard	2
			Alexandrine	3
			Douillard	4
37	6.1.3	Affinità con il cotogno		
		non affine	<i>P. ussuriensis</i>	0
		molto scarsa scarsa	Kaiser Dr. Guyot	1
		intermedia	William's	3
				5
		buona eccellente	Curato Passa Crassana, Decana del	7 9
38	8.1.1	Grado di suscettibilità alla psilla (<i>Psylla pyri</i>)		
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0
		scarsa	Old Home	1
		medio scarsa media	Kieffer Anjou	3
				5
		medio elevata elevata	William's Aurora	7 9
39	8.3.1	Grado di suscettibilità al fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)		
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0
		scarsa	Spinacarpì	1
		medio scarsa media	Honeysweet	3
			Kaiser	5
		medio elevata elevata	William's Old Home	7 9

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.





Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

Nel 2024 non ha prodotto frutti. Non sono state possibili misurazioni.

17 GIBA	20 -	Dentatura del margine fogliare		
				
		 assente	Beurré Giffard	1
		 crenato	Beurré d'Amanlis	2
		 decisamente serrato	Alexandrine Douillard	3
		 nettamente seghettato	General Leclerc	4
18 GIBA	22 (*) -	Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale		
		debole	Precoce di Trévoux	3
		media	Beurré Giffard	5
		forte	Comtesse de Paris	7
19 GIBA	23 (*) -	Picciolo: lunghezza		
		corto	Épine du Mas	3
		medio	Beurré Hardy	5
		lungo	Trionfo di Vienna	7
		Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo		

20	25 (*) -		corta	Decana del Comizio	3
			media	Beurré Bosc	5
			lunga	Conference	7
		Epoca di maturazione per la raccolta			
21 GIBA	65 (*) 6.2.15	molto precoce		Mirandino rosso	1
		precoce		Precoce di Trévoux	3
		intermedia		Coscia	5
		tardiva		Jeanne d'Arc, Beurré Hardy	7
		molto tardiva		Président Drouard	9

22 GIBA	-	Forma del frutto			
			sferoidale	Fico di Udine	1
			turbinata breve	Spina Carpi	2
			maliforme	Oliver de Serves, Possa Crossara	3
			doliforme	Decana di Inverno	4
			turbinata	Decana del Comizio	5
			piriforme	Coscia	6
			cidoniforme	William	7
			alebassiforme	Abate Fétèl	8
		Dimensione del frutto			
		molto piccolo	Garofalo	1	

23 GIBA	41 (*) 6.2.8	piccolo	Doyenné de Juillet	3
		medio	Dr. Guyot	5
		grande	Decana del Comizio, Passa Crassana	7
		molto grande	Margarete Marillant	9
24 GIBA	44 (*) 6.2.12	Colore di fondo della buccia		
		non visibile verde	Grand Champion, Uta Nouveau Poiteau	1
		verde giallastro	Beurré Giffard, Beurré Hardy	2
				3
		giallo	Président Drouard	4
25 GIBA	45 (*) 6.2.13	Frutto: estensione area di sovraccolore		
		assente o molto piccola	Passa Crassana	1
		piccola	Precoce di Trévoux	3
		media	Nordhäuser Winterforelle	5
		estesa	Beurré Clairgeau	7
		molto estesa o intera superficie	Starkrimson	9
26 GIBA	46 -	Tonalità di sovraccolore		
		arancione	Precoce di Trévoux	1
		rosso arancione	Duchesse Elsa	2
		rosso rosato	Belle Angevine	3
		rosso chiaro	Nordhäuser Winterforelle	4
		rosso scuro	Starkrimson	5
27 GIBA	50 (*) 6.2.11	Frutto: lunghezza del peduncolo		
		corto	Beurré d'Anjou	3
		medio	Beurré Hardy	5
		lungo	Kaiser, Curato	7
28	51 (*) -	Frutto: spessore del peduncolo		
		sottile medio	Concorde Beurré Hardy	3
		spesso	Beurré d'Anjou	5
				7
29 GIBA	53 (*) -	Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse		
		dritto	Bonne de Beugny	1
		obliquo	Decana del Comizio	2
		angolo retto	Abate Fétèl	3
		Frutto: profondità della cavità del peduncolo		

30 GIBA	54 (*) -	assente o molto piccola	Conference	1
		piccola	Buona Luisa d'Avranches	3
		media	Precoce di Trévoux	5
		profonda	Passa Crassana	7
		molto profonda	Oliver de Serres	9
31 GIBA	57 (*) -	Frutto: profondità della cavità calicina (alla raccolta)		
		assente	Eparene	1
		poco profonda media	Precoce di Trévoux	3
			Beurré Giffard, Beurré Hardy	5
	profonda	Passa Crassana	7	
32 GIBA	58 (*) -	Frutto: ampiezza della cavità calicina (alla raccolta)		
		stretto	Williams'	3
		medio	Beurré Hardy	5
	ampio	Passa Crassana	7	
33	60 -	Frutto: tessitura della polpa		
		fine	Beurré Hardy	3
		media	Kaiser	5
	grossolana	Curato	7	
34	61 6.2.21	Frutto: consistenza della polpa		
		tenera	Jeanne d'Arc	3
		media	Beurré Hardy	5
	soda	Comtesse de Paris	7	
35	62 -	Frutto: succosità della polpa		
		asciutta media	Mirandino rosso Williams'	3
		succosa	Conference	5
				7
	molto succosa	Decana del Comizio	9	
36 GIBA	63 (*) -	Seme: forma		
		rotondo	Jeanne d'Arc Beurré Giffard	1
		ovato ellittico	Alexandrine Douillard	2
			3	

		ellittico stretto	Dr. Guyot, Curé	4
37	- 6.1.3	Affinità con il cotogno		
		non affine	<i>P. ussuriensis</i>	0
		molto scarsa	Kaiser	1
		scarsa	Dr. Guyot	3
		intermedia	William's	5
		buona	Curato	7
		eccellente	Passa Crassana, Decana del Comizio	9

38	8.1.1	Grado di suscettibilità alla psilla (<i>Psylla pyri</i>)		
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0
		scarsa	Old Home	1
		medio scarsa	Kieffer Anjou	3
		media		5
		medio elevata	William's	7
		elevata	Aurora	9

39	8.3.1	Grado di suscettibilità al fuoco batterico (<i>Erwinia amylova</i>)		
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0
		scarsa	Spinacarpì Honeysweet	1
		medio scarsa	Kaiser	3
		media		5
		medio elevata	William's	7
		elevata	Old Home	9

80. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Pyrus communis* L. (pero)



DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV, sono segnalati con un asterisco (*).

n.	Codici: UPOV IBPGR	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1 6.1.2	Vigore dell'albero		
		debole	Precoce di Trévoux	3
		medio	William's	5
		forte	Beurré d'Amanlis	7
2 GIBA	2 (*) -	Tipo di ramificazione		
		assente o molto debole	Jeanne d'Arc	1
		debole	Buona Luisa d'Avranches	3
		medio	Conference	5
		forte	Alexandrine Douillard	7
		molto forte	Oliver de Serres	9
3 GIBA	3 (*) 6.1.1	Portamento dell'albero		
				
		fastigiato	Jeanne d'Arc	1
				
		eretto	Beurré Clairgeau	2
				
		semi-eretto	Colorée de Juillet	3
				
espanso	Madame Ballet	4		
				
pendulo/ricadente	Beurré Diel	5		
				
piangente	Armida, Beurré d'Amanlis	6		

4 GIBA	5 -	Rami di 1 anno: lunghezza dell'internodo		
		corto	Conference	3
		medio	Jeanne d'Arc	5
		lungo	Santa Maria	7
5 GIBA	6 -	Rami di 1 anno: colore predominante del lato esposto al sole		
		grigio-verde	Mirandino rosso	1
		grigio-marrone	Concorde	2
		marrone	Precoce di Trévoux	3
		marrone aranciato	Eva Baltet	4
		rosso mattone	Beurré Hardy	5
		marrone purpureo	Nordhäuser Winterforelle	6
		marrone scuro	Jeanne d'Arc	7
6 GIBA	7 -	Rami di 1 anno: numero di lenticelle		
		poche	Trionfo di Vienna	3
		medie	William's	5
		molte	Beurré d'Amanlis	7
7 GIBA	11 (*) -	Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice vegetativo		
		assente o molto debole	Clapp's Favourite	1
		debole	Decana del Comizio	3
		media	Beurré Hardy	5
		forte	Red Bartlett	7
		molto forte	Liegels Winterbutterbirne	9
8 GIBA	64 (*) 6.2.1	Epoca di inizio fioritura		
		molto precoce precoce	Beurré Alexandre Lucas Delfrap	1
		intermedia	Packham's Triumph	3
				5
		tardiva	Jeanne d'Arc	7
molto tardiva	Frangipane	9		
9	27 (*) -	Gemme fiorali: lunghezza		
		corte	Beurré Alexandre Lucas	3
		medie	Buona Luisa d'Avranches	5
		lunghe	Beurré Hardy	7
10	30 (*)	Fiore: posizione dei margini dei petali		
		separati	Kaiser	1

GIBA	-	che si toccano sovrapposti	Jeanne d'Arc Conference	2 3
11 GIBA	33 (*) -	Fiore: forma dei petali circolare ampiamente ovata ovata	Comtesse de Paris Beurré Hardy Kaiser	1 2 3
12 GIBA	31 -	Fiore: posizione dello stigma in relazione agli stami sotto stesso livello sopra	Jeanne d'Arc Beurré Hardy Beurré d'Amanlis	1 2 3
13 GIBA	13 (*) -	Lamina fogliare: posizione in relazione al ramo  verso l'alto  orizzontale  verso il basso	Precoce di Trévoux Decana del Comizio Beurré Giffard	1 2 3
14 GIBA	16 (*) -	Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza molto piccolo piccolo medio grande molto grande	Curé Président Druard Conference Triomphe de Vienne Beurré Lebrun	1 3 5 7 9
		Lamina fogliare: forma della base		

15 GIBA	17 -		acuta	Beurré Giffard	1
			angolo retto	Santa Maria, Grand Champion	2
			ottusa	Général Leclerc	3
			troncata	Decana del Comizio	4
			cordata	Président Drouard	5
		Lamina fogliare: forma all'apice			
16 GIBA	18 -		acuta	Conférence	1
			angolo retto	William's	2
			ottusa	Beurré Clairgeau	3
			rotonda	Curato	4